Carex tomentosa L.

Filz-Segge



Flora zwischen Landau und Germersheim
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Anmerkung von C.Weingart 2006:
Wechseltrockenheitszeiger in mageren Auenwiesen und Trespen-Halbtrockenrasen, sowie an lichten, grasigen Stellen in Hartholz-Auwäldern, auch an Sekundärstandorten wie Dämmen oder ehemaligen Tongruben; besonders an sonnigen bis leicht beschatteten, mäßig trockenen bis wechselfeuchten Stellen mit höchstens mäßig nährstoffhaltigen, basen- und oft kalkreichen, neutralen bis leicht sauren, humosen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben Carex flacca, Cirsium tuberosum, Inula salicina, Serratula tinctoria, Galium boreale, Brachypodium pinnatum agg., Molinia arundinacea, Sanguisorba officinalis und Silaum silaus.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 3

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: V

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Carex_tomentosa.PDF

zu www.FloraWeb klicke dort => http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1295