


Carpinus betulus L.

Hainbuche



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Kraut- oder grasreiche Laubmischwälder, v. a. in Hartholz-Auwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern; an mehr oder weniger beschatteten, trockenen bis wechselfeuchten Stellen mit zumindest mäßig nährstoffhaltigen, recht basenreichen bis kalkreichen, neutralen bis mäßig sauren, humosen, mittel- bis tiefgründigen, steinigen, sandigen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Quercus robur*, *Q. petraea*, *Tilia cordata*, *Acer campestre*, *Prunus avium*, *Fagus sylvatica*, *Melica uniflora*, *Stellaria holostea*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Dactylis polygama*, *Galium sylvaticum*, *Phyteuma nigrum*, *Potentilla sterilis* und *Corylus avellana*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Carpinus_betulus.PDF

zu [www.Floraweb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1318) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1318>