


Dysphania botrys (L.) Mosyakin Clemants (E)

ehemals: *Chenopodium botrys* L.

Klebriger Gänsefuß



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Pionier- und lückige, kurzlebige Ruderalges.an Kiesabbaustellen, geschotterten Rainen und Stellflächen, in Sandgruben und wohl sehr unbeständig auf Müll- und Erddeponien; an spärlich bewachsenen, vollbesonnten, warmen, trockenen bis sommerdürren Stellen mit mehr oder weniger nährstoffreichen, meist basen- und kalkreichen, neutralen oder leicht sauren, lockeren, sehr durchlässigen, meist humusarmen sandigen, kiesigen oder grusigen Substrat neben *Corispermum leptopterum*, *Salsola kali* subsp. *tragus*, *Psyllium arenarium*, *Chenopodium pumilio*, *Eragrostis minor*, *Portulaca oleracea*, *Centaurea diffusa*, *Digitaria sanguinalis*, *Conyza canadensis*, *Herniaria glabra*, *Amaranthus albus* und *Vulpia myuros*.

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Dysphania_botrys.PDF