


Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Kohldistel



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Feuchtwiesen sowie Hochstauden-, Röhricht und Großseggen-Bestände in selten oder nicht mehr gemähten Moor- und Naßwiesen, an Säumen und in lichten Bereichen von Au- und Bruchwäldern sowie an Gräben und Ufern; vorzugsweise an sonnigen bis halbschattigen, wechselfeuchten bis nassen Stellen mit nährstoff- und basenreichen, neutralen bis mäßig sauren, humosen, sandigen oder reinen Lehm- bis Tonboden neben Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Caltha palustris, Angelica sylvestris, Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum, Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Lotus pedunculatus, Achillea ptarmica, Symphytum officinale, Carex acutiformis, C. acuta, C. disticha, Alopecurus pratensis, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Silene flos-cuculi und Juncus-Arten.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Cirsium_oleraceum.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1573) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1573>