


# Cirsium tuberosum (L.) All.

## Knollige Kratzdistel



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Trespen-Halbtrockenrasen und magere Auenwiesen, meist nur noch in Fragmenten an grasigen Böschungen und Rainen; besonders an sonnigen, warmen, wechsellrockenen Stellen mit höchstens mäßig nährstoffhaltigen, basen- und oft kalkreichen, humosen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Carex flacca*, *C. tomentosa*, *Inula salicina*, *Serratula tinctoria*, *Galium boreale*, *G. verum* agg. *Brachypodium pinnatum* agg., *Molinia arundinacea*, *Sanguisorba officinalis*, *Silaum silaus*, *Primula veris*, *Bromus erectus*, *Scabiosa columbaria* und *Colchicum autumnale*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 3

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: 3

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = [https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK\\_Botanik/FloraPfalz/Cirsium\\_tuberosum.PDF](https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Cirsium_tuberosum.PDF)

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1578) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1578>