


Colchicum autumnale L.

Herbst-Zeitlose



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Charakterart extensiv genutzter Mähwiesen, Streuobstwiesen und Weiderasen an frischen bis wechselfrischen, (mäßig) nährstoff- und basenreichen, aber nicht überdüngten Standorten. Zu den typischen Begleitpflanzen zählen hier: *Trisetum flavescens*, *Helictotrichon pubescens*, *Bellis perennis*, *Lotus corniculatus*, *Trifolium pratense*, *Achillea pratensis*, *Galium album*, *Centaurea jacea* und *Sanguisorba officinalis*. Außerdem noch an vielen Stellen in Auwäldern und Auengebüschen neben *Cardamine pratensis*, *Deschampsia cespitosa*, *Paris quadrifolia*, *Listera ovata*, *Ranunculus ficaria* subsp. *bulbilifera*, *R. auricomus* agg., *Galium mollugo* s. str., *Veronica chamaedrys* und *Ajuga reptans* wachsend. Die Vorkommen weisen fast immer auf tiefgründige, lehmige Böden hin.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Colchicum_autumnale.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1610) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1610>