


# Lepidium didymum L. (E)

ehemals: *Coronopus didymus* (L.) Sm.

Zweiknotiger Krähenfuß



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Unkraut-, Trittpflanzen- und kurzlebige Ruderalges., v. a. in Gärten, Friedhöfen, Pflasterfugen, auf Deponiegelände, unbefestigten Wegen und Stellflächen, sowie an Bau- und Schuttstellen; vorzugsweise an lückigen, kurzrasigen, vollbesonnten, warmen, frischen bis wechsellrockenen Stellen mit nährstoff- und oft auch basenreichen, neutralen bis mäßig sauren, lockeren oder zumindest durchlässigen, grusigen, sandigen oder reinen Lehmboden neben *Conyza canadensis*, *Crepis capillaris*, *Herniaria glabra*, *Chamaesyce maculata*, *Portulaca oleracea*, *Oxalis corniculata*, *Polygonum aviculare* agg., *Veronica persica*, *V. peregrina*, *Cerastium glomeratum*, *C. holosteoides*, *Senecio vulgaris*, *Lamium amplexicaule*, *Eragrostis minor*, *Sagina procumbens*, *S. micropetala*, *Poa annua* und *Capsella bursa-*

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = [https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK\\_Botanik/FloraPfalz/Lepidium\\_didymum.PDF](https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Lepidium_didymum.PDF)