


# Corydalis cava (L.) Schweigg. Körte s. l.

ehemals: Corydalis cava (L.) Schweigg. Koerte

Hohler Lerchensporn



Flora zwischen Landau und Gernersheim  
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Anmerkung von C.Weingart 2006:

Geophytenreiche Auwälder, bachbegleitende Erlen-Eschengehölze, Auengebüsche, alte Friedhöfe und Parkanlagen, sehr selten auch in Weinbergen v. a. in Hecken und an alten Lößböschungen. An beschatteten, selten auch sonnigen, mehr oder weniger frischen bis leicht sickerfeuchten Stellen mit nährstoff- und basenreichen, oft auch kalkreichen, tiefgründigen, lockeren, humosen steinigen, sandigen oder reinen Lehmboden neben Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Ranunculus ficaria, R. auricomus agg., Viola odorata, Arum maculatum, Aegopodium podagraria, Veronica hederifolia subsp. lucorum, Alliaria petiolata, Glechoma hederacea und Allium ursinum.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = [https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK\\_Botanik/FloraPfalz/Corydalis\\_cava\\_subsp\\_cava.PDF](https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Corydalis_cava_subsp_cava.PDF)

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1669) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1669>