


Filipendula vulgaris Moench

Knollige Spierstaude



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Kalkmagerrasen, v. a. in den letzten Resten wechsellrockener Stromtal-Pfeifengraswiesen an Säumen, auf Verlichtungen und an Dämmen im Bereich der Rheinwaldungen, ferner einmal als Relikt in einem mageren Scherrasen; besonders an sonnigen bis leicht beschatteten, warmen, selten gemähten, wechsellrockenen Stellen mit mäßig nährstoffhaltigen, basenreichen, meist auch kalkreichen, neutralen, humosen, sandigen bis tonigen Lehmboden neben *Brachypodium pinnatum* agg., *Bromus erectus*, *Carex tomentosa*, *C. flacca*, *Inula salicina*, *Peucedanum officinale*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Primula veris*, *Viola hirta*, *Plantago media*, *Fragaria viridis*, *Geranium sanguineum*, *Serratula tinctoria* und *Veronica teucrium*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 3

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: 3

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Filipendula_vulgaris.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=2462) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=2462>