


Papaver rhoeas L.

Klatsch-Mohn



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Getreidefelder, junge Ackerbrachen, seltener auch in Gärten und anderen Hackfruchtkulturen sowie an lückigen Ruderalstellen, z. B. Erdaufschüttungen und andere Rohbodenstellen; vorzugsweise an vollbesonnten, trockenen bis recht frischen Stellen mit nährstoff- und basenreichen, oft kalkhaltigen, neutralen bis leicht sauren, tiefgründigen, lockeren, humosen Lehmboden, seltener auch sandigen oder tonigen Boden neben *Avena fatua*, *Sinapis arvensis*, *Matricaria recutita*, *Thlaspi arvense*, *Cirsium arvense*, *Elymus repens*, *Equisetum arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Anagallis arvensis*, *Myosotis arvensis*, *Tripleurospermum perforatum* und *Alopecurus myosuroides*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Papaver_rhoeas.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=4115) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=4115>