


Rumex crispus L. s. l.

ehemals: Rumex crispus L.

Krauser Ampfer



Flora zwischen Landau und Gernersheim
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Anmerkung von C.Weingart 2006:

Gestörte Röhricht-Bestände und Rasen sowie Ruderalges. an stickstoffreichen Orten, v. a. vernäbte Ackerstellen und entsprechende junge Brachflächen, an Rainen, Ufern, Gräben, intensiv genutzte Feuchtweiden, Misthaufen, Viehläger, Mülldeponien und ähnliche Ruderalstellen; besonders an sonnigen bis schwach beschatteten, frischen bis wechsellässen, auch periodisch kurzzeitig überfluteten Stellen mit sehr nährstoff- und oft basenreichen, neutralen bis mäßig sauren, tiefgründigen oft verdichteten sandigen, humosen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben Ranunculus repens, Lolium perenne, Rumex obtusifolius, Agrostis stolonifera, Poa annua, P. trivialis, Plantago major, Cirsium arvense, Elymus repens, Alopecurus pratensis, Potentilla reptans, Carex hirta, Cerastium

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = http://www.pfalz.de/flora/images/stories/AF_Botanik/FloraPfalz/Rumex_crispus_subsp_crispus_x_R_patiensis.pdf

zu [www.FloraWeb](http://www.FloraWeb.de) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5083>