


Rumex sanguineus L.

Hain-Ampfer



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Krautreiche Laubwälder, v. a. in Auwäldern und sickerfeuchten Hangwäldern, besonders an Waldwegen und auf Schlagflächen, Auengebüsche, im Siedlungsbereich selten in Gehölzen alter Friedhöfe oder Parkanlagen; vorzugsweise an halbschattigen bis schattigen, wechsellustigen bis sickerfeuchten Stellen mit nährstoff- und basenreichen, neutralen bis mäßig sauren, tiefgründigen, oft verdichteten, humosen sandigen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Cardamine impatiens*, *Carex sylvatica*, *C. remota*, *C. strigosa*, *Scrophularia nodosa*, *Veronica montana*, *Festuca gigantea*, *Brachypodium sylvaticum*, *Circaea lutetiana* und *Stachys sylvatica*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Rumex_sanguineus.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5105) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5105>