


# Torilis japonica (Houtt.) DC.

## Gewöhnlicher Klettenkerbel



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Kurzlebige Ruderalges. beschatteter Orte, v. a. auf Schlagflächen, an Waldwegen, Verlichtungen und Gehölzrändern, seltener in Hecken, Rebflächen, verwilderten Gärten, entsprechenden Brachen und Parkanlagen; vorzugsweise an halbschattigen, mäßig trockenen bis frischen Stellen mit (recht) nährstoffreichen, neutralen bis sauren, lockeren, humosen, steinigen oder reinen sandigen bis tonigen Boden neben Galeopsis tetrahit, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, Lapsana communis, Chaerophyllum temulum, Veronica hederifolia subsp. lucorum, Sambucus nigra, Brachypodium sylvaticum, Galium aparine, Urtica dioica, Ranunculus ficaria, Mycelis muralis und Moehringia trinerva.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = [https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK\\_Botanik/FloraPfalz/Torilis\\_japonica.PDF](https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Torilis_japonica.PDF)

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5987) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5987>